

DICARZOL® 50 PS

Polvo soluble

Composición

Formetanato: metilcarbamato 3-dimetilaminometilenaminofenilo	50 g (*)
Inertes c.s.p	100 g

(*) corresponde a 58,2 g de la sal de clorhidrato.

Generalidades

DICARZOL® 50 PS actúa por inhibición de la acetil-colinesterasa, controlando las plagas por contacto o ingestión, tanto los estadios móviles (larvas, ninfas) como adultos.

Preparación y equipos de aplicación

Preparación	Agregar al tanque del equipo pulverizador con agua la cantidad necesaria de DICARZOL . Completar el tanque con la cantidad de agua necesaria. Preparar solamente la cantidad que se aplicará dentro de 4 horas.
Equipos de aplicación	Aplicar con equipos de alto volumen mojando frutas, follajes y ramas de forma homogénea, para manzano, pelón y citrus con un mínimo de 2.000 l/h ; para pimiento y tomate usar volúmenes mínimo de 1.000 l/ha.

Recomendación de uso

Cultivo	Plagas	Dosis g/100 l	Dosis kg/ha *	Momento de aplicación
Pimiento y Tomate	Trips de las flores (Frankliniella occidentalis)	150-200 ó 100 + 1 kg de azúcar	1.5-2.0 ó 1.0 + 10 kg de azúcar	Aplicar con la presencia de 1 trips/ planta hasta floración y 1 trips/ flor de floración. El umbral esta determinado para evitar la infección de peste negra dado que el insecto es vector de la enfermedad.
Manzano	Trips de las flores (Frankliniella occidentalis)	75	1.5	Aplicar en plena floración.
Pelón	Trips de las flores (Frankliniella occidentalis)	75	1.5	Aplicar 1ro en plena floración y 2do en precosecha
Cítricos	Acaro de tostado (Phyllocoptruta oleivora)	10-15	0.25-0.37	Iniciar los tratamientos al observar más de 3 ácaros/ fruto.
	Acaro de la yema (Aceria sheldoni)	15-20	0.37-0.50	Iniciar los tratamientos a comienzos de la primavera y otoño al aparecer los ácaros y quedar expuestos al tratamiento. La dosis menor se recomienda para infestaciones bajas.
Cultivos Florales Ormanentales y Césped	Arañuela de las flores (Tetranychus spp.) Trips californiano (Frankliniella occidentalis) Trips de las flores (Frankliniella rodeos)	60-100		Iniciar aplicación al observar las primeras formas móviles y ni bien se noten los primeros ataques de los ácaros y trips.

(*) Las dosis por superficie es calculada por los volúmenes de caldo aplicados: Cítricos: 2500 l/ha; Manzano y Peral: 200 l/ha; Tomate y Pimiento: 1000 l/ha

Para un mejor manejo, se recomienda en general, no exceder de dos aplicaciones con carbamatos seguidas, pudiendose aplicar productos de otro grupo químico.

Restricciones de uso

Entre aplicación y cosecha deben transcurrir: Manzanos: uso posicionado; Tomate y pimiento: 3 días; Cítricos: 7 días; Pelón: 15 días.

“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”

Compatibilidad

DICARZOL® 50 PS es compatible con la mayoría de los plaguicidas, a excepción de los de reacción alcalina (polisulfuro de calcio, caldo bordelés)

Producto inscripto en la SAG P y A (SENASA) con el N° : 31.760